

National Early Warning Score 2 (NEWS2)

De NEWS2-score bepaalt de mate van ziek zijn van een zorgvrager en zet aan tot interventie(s) en overleg met bijvoorbeeld een dienstdoende arts. Zodra de NEWS2-score een zorgvrager identificeert die het risico loopt op achteruitgang, zal er door de zorgverlener overleg gepleegd moeten worden met een arts of moet de zorgverlening geanalyseerd worden met bijvoorbeeld de inzet van meer specialistische hulp en/of een ambulance. Het kan dan ook nodig zijn dat er frequenter controles van de vitale functies moeten plaatsvinden.

Ingezette interventies en stappen zijn afhankelijk van onder andere gemaakte beleidskeuzes en wensen van de zorgvrager. De NEWS2-score vervangt niet het niet-pluisgevoel van een zorgverlener.

National Early Warning Score 2 (NEWS2)							
Vitale parameter	3	2	1	Score 0	1	2	3
Ademfrequentie (per minuut)	<8		9-11	12-20		21-24	>25
Spo2 schaal 1 (%)*	<91	92-93	94-95	>96			
Spo2 schaal 2 (%)*	<83	84-85	86-87	88-92 >93 met kamerlucht	93-94 met zuurstof	95-96 met zuurstof	>97 met zuurstof
Met lucht of zuurstof**		Met zuurstof		Met kamerlucht			
Systolische bloeddruk (mmHG)	<90	91-100	101-110	111-219			>220
Hartfrequentie (Per/minuut)	<40		41-50	51-90	91-110	111-130	>131
Bewustzijn***				Alert			CVPU
Temperatuur	< 35,0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	>39.1	

* Schaal1: >96% normaalwaarde zorgvrager

Schaal2: 88-92% geaccepteerd als normaalwaarde voor zorgvrager

** Als zorgvrager O2 nodig heeft om de Spo2 normaalwaarde te behalen, dan is de score 2 punten hoger.

*** C = nieuwe verwarring

De zorgvrager heeft een nieuwe (niet eerder vertoonde) verwardheid, desoriëntatie en/of agitatie, waar voorheen zijn gemoedstoestand normaal was - dit kan subtiel zijn. De zorgvrager kan op coherente wijze reageren op vragen, maar er is enige verwarring, desoriëntatie en/of agitatie. Dit scoort 3 punten in de NEWS2.



National Early Warning Score (NEWS)

INTERPRETATIE			
NEW score	Klinisch risico	Frequentie van monitoring	Reactie
0 – 4	Laag	Minimaal elke 12 uur bij een score van 0 Minimaal elke 4-6 uur bij een score van 1 -4	Beoordeling door een verpleegkundige of gelijkwaardig, om te beslissen over een verandering in de frequentie van klinische monitoring of over escalatie van de zorg.
Score van 3 voor elke individuele parameter	Laag-medium	Minimaal elk uur	Dringende beoordeling door een arts op de afdeling, om te beslissen over een wijziging in de frequentie van klinische monitoring of over escalatie van de zorg.
5 – 6	Medium	Minimaal elk uur	Dringende beoordeling door een arts op de afdeling of een verpleegkundige, om te beslissen of beoordeling door een SIT-team en/of ambulance nodig is.
>7	Hoog	Continue monitoring van vitale functies	Spoedeisende beoordeling door een SIT-team en/of ambulancezorg nodig. Meestal overgedragen naar een hoger zorgniveau.

